



STATION POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 300 (20/95) 12/09/1995

COLZA: Attention aux tenthrèdes

COLZA: stade levée à B3.

INSECTES

Situation

Grosses Altises

Le vol n'a pas débuté.

Tenthrèdes de la rave

Des captures d'adultes sont enregistrées en cuvettes jaunes. La ponte intervient dès leur arrivée dans les colzas, la durée de vie des adultes étant très courte.

Pucerons

Pas de capture à la tour de Biard. Pas d'ailé dans les parcelles.

<u>Préconisation</u>

Surveillez les tenthrèdes ; intervenir sur les larves dès les premiers dégâts (Avertel page 7).

MALADIES (Phoma)

Le suivi biologique du Phoma est réalisé en collaboration avec les Chambres d'Agriculture grâce à la contribution financière du CETIOM, des sociétés phytosanitaires CIBA-GEIGY et SOPRA.

Situation

A Biard, les périthèces sont en cours de développement mais la maturation n'est pas atteinte. Aucune capture de spores n'a été observée depuis le 20 Août.

Les projections de spores seront également suivies sur 4 autres sites (Nord et Centre-Est Vienne, Nord-Charente, Charente-Maritime).

Préconisation

Il est trop tôt pour envisager une intervention.

TOURNESOL : stade maturation (M3-M4).

MALADIES

Le Phoma est très présent sur tige et capitule ; les nécroses en bas de tige favorisent un dessèchement prématuré de la plante.

Le Phomopsis ne s'est manifesté que tardivement, essentiellement, sur capitule, dans certains secteurs.


MAIS: stade grains pâteux à vitreux.

RAVAGEURS

Pyrale, Sésamie

Les comptages larvaires sont en cours de réalisation afin d'établir la cartographie.

P24



Publication périodique

ISSN 0294 - 4693



40830